

	Jahr 2017												Gesamt	Jährliche Zahlen		
	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Durschnitt 5 Vorig. Jahr	Minimum	Maximum
Langdistanzwanderer																
Aal (b)				1	3 175	17 093	1 568	138	10				21 985	8 692	5 942	27 930
Lachs	1	2	10	10	45	22	5	2	2				99	71	23	152
Meerforelle	2				1	31	4	0	2				40	78	32	145
Maifisch					22	10							32	56	0	161
Meerneunauge				4	15								19	26	0	110
Neunauge (sp. Fluss)													0	1	0	3
Kurz- und Mitteldistanzwanderer																
Art nicht erkennbar		2	13	33	44	22	14	14	57				199	61	-	-
Äsche													0	1	0	2
Bachforelle	5	3	18	15	24	41	5	6	16				133	52	23	78
Barbe			19	116	775	250	144	50	303				1 657	3 012	1 671	8 606
Barsch					1	7	9	20	303				340	73	38	325
Brachse			16	124	1 574	137	50	192	263				2 356	2 880	1 139	20 075
Brachse (klein) (c)				22	147	11	6	32	10				228	343	211	627
Döbel			6	14	10	1	2		1				34	108	27	208
Graskarpfen					2								2	7	0	9
Gründling													0	0	0	13
Güster													0	0	0	1
Hecht					1								1	4	1	7
Karusche													0	3	0	8
Karpfen													0	19	2	27
Nase		5	476	91	213	84	216	184	46				1 315	3 606	759	9 210
Rapfen		1	31	12	221	132	38	43	47				525	1 791	275	5 283
Regenbogenforelle													0	0	0	1
Rotauge			45	17	8	2	1	13	126				212	206	98	723
Salmenartige (klein) (d)				4									4	0	0	8
Schleie					5	1			1				7	12	8	34
Ukelei					19	76	55	5	1 931				2 086	548	210	4 115
Wels					20	33	27	7	4				91	62	16	90
Gesamt	8	13	634	463	6 322	17 953	2 144	706	3 122	0	0	0	31 365	21 710		
Durschnitt 5 Vorig. Jahr	21	46	1 184	5 515	5 530	9 360	6 632	1 447	1 858	865	347	78				
Minimum mensuel	0	1	31	661	1 599	557	134	134	155	90	71	8				
Maximum mensuel	105	295	6 036	20 217	21 397	34 015	18 572	4 568	6 553	2 612	964	269				

- (a) Die Zählung von Fischen erfolgt am Fischpass primär mittels Videoaufzeichnung.
- (b) Eine spezielle Untersuchung hat ergeben, dass rund 95% der im Fischpass aufsteigenden Aale erfasst werden können. Der Gesamtaufstieg an Aalen ist daher entsprechend nach oben zu korrigieren
- (c) Mit der Videobeobachtung können Brachsenartige kleiner etwa 30 cm Länge nicht eindeutig nach Arten (Brachse, Zobel, Zope) differenziert werden.
- (d) Mit der Videobeobachtung sind Smolts mit einer Länge kleiner als 25 cm nicht von anderen Salmonidenarten zu unterscheiden.

Die Zählungen werden durchgeführt von Saumon-Rhin unter Kontrolle der AFB mit technischer und finanzieller Unterstützung folgender Partner :












